Guide d'autosoins pour changer un pansement

Votre infirmier(-ère) a choisi un pansement Mepitel® One pour votre plaie

Marche à suivre pour appliquer un pansement Mepitel® One

- **1.** Lavez-vous les mains à l'eau chaude et au savon pendant 20 secondes.
- 2. Nettoyez la plaie en suivant les recommandations de votre infirmier(-ère) et séchez soigneusement la peau périlésionnelle.
- **3.** Sortez le pansement de son emballage.
- 4. Ôtez le feuillet protecteur numéro 1.



5. Appliquez Mepitel One sur la plaie, face adhésive vers le bas. Veillez à appliquer Mepitel One dans le sens du lambeau de la déchirure cutanée, en partant du bas.





6. Ôtez le feuillet protecteur numéro 2 et lissez les bords sur la peau autour de la plaie pour une bonne étanchéité.

Attention:

- ✓ Respectez la direction indiquée sur le pansement pour le retrait.
- ✓ Le pansement Mepitel One est à usage unique et ne peut pas être réutilisé

Le pansement Mepitel One doit être manipulé et changé par un-e professionnel·le de la santé, mais si aucun-e n'est disponible, un-e membre de votre famille ou vous-même pouvez être amené-e à le changer. Le fabricant rejette toute responsabilité concernant l'application d'un pansement par ces personnes. Par conséquent, si le pansement Mepitel One est appliqué par une personne qui n'est pas un-e professionnel·le de la santé. l'utilisateur-rice le fait à ses propres risques et périls.

7. Au-dessus du pansement Mepitel One, placez le pansement de protection que vous a conseillé votre infirmier(-ère).



8. Utilisez un bandage pour garder le pansement en place.



Quand changer votre pansement

Votre infirmier(-ère) vous conseille de changer le pansement :

Pour une aide et des conseils, veuillez contacter votre infirmier(-ère) :

Si vous avez accès à Internet, voici une vidéo qui explique la marche à suivre pour appliquer le pansement (suivez le lien ou scannez le code QR avec votre téléphone):



www.molnlycke.com/Mepitel-One-application-skin-tears



